

DESCRIPTIONS DE COLÉOPTÈRES NOUVEAUX

RECUUEILLIS EN CHINE

PAR M. DE LATOUCHE

PAR L. FAIRMAIRE.

Ges insectes ont été recueillis aux environs de Koua-Toun, dans le Szé-Tchouen, sauf un petit nombre dont les localités spéciales sont indiquées. Le nombre des espèces intéressantes qui sont décrites ci-après fait regretter que les récoltes de M. de Latouche n'aient pas été plus abondantes.

Silpha bicolor n. sp. — Long. 48 à 49 mill. — *Lata. parum convexa, fusco-cyanescens, modice nitida, prothorace rufo, medio levissime obscuriore, subtus cum pedibus cyanea, nitida; capite sat parvo, fronte trisulcata, clypeo antice arcuatim emarginato, antennis brevibus, apice valde clavatis, piceis, nitidis, articulis 3 ultimis cinereo-pubescentibus, opacis, ultimo sat acuminato; prothorace lato, transverso, antice sat angustato, lateribus rotundatis, dorso dense punctato, disco fere laevi, medio breviter sulcato, utrinque paulo convexiore, postice tuberculis 2 sat minutis et extus sulculo arcuato, margine postico utrinque leviter sinuato, angulis sat rotundatis; elytris latis, late marginatis, dense punctatis, sutura et utrinque costis 3 politis, fere metallicis, 1^e integra, 2^e apice obsoleta, 3^e praecedenti proxima, ante apicem abbreviata; subtus cum pedibus subtiliter asperula, tibiis costulatis; ♂ elytris apice fere truncatis, ad suturam oblique truncatis, abdomine elytris breviore; ♀ elytris paulo longioribus, apice magis oblique truncatis, ad suturam similiter truncatis, abdomine elytris longiore.*

Resssemble à la *S. cyanipennis* Hope, de l'Inde, mais le corselet est unicolore, à peine plus foncé sur le disque, les élytres sont moins nettement tronquées, coupées obliquement à l'angle sutural qui est obtus. Resssemble aussi beaucoup à la *S. brunnicollis* Motsch., du Japon; mais cette dernière est plus noirâtre, les élytres sont plus largement rebordées, leur extrémité est coupée obliquement de dedans en dehors et bien moins arrondie en dehors. L'angle apical forme une très petite épine; le corselet est semblablement coloré et sculpté, mais il est plus large, plus arrondi sur les côtés.

Thymalus chinensis n. sp. — Long. 7 mill. — Resssemble à notre

T. limbatus, même forme, même coloration et même pilosité; en diffère par le corselet à bords latéraux plus déprimés, moins relevés, plus transparents, plus rugueux, plus arrondis aux angles postérieurs, plus fortement échantré en avant avec les angles plus saillants, l'écusson déprimé, les élytres très inégales, à lignes de points peu régulières, surtout vers la suture, cette ponctuation notablement plus fine, surtout sur les côtés et à l'extrémité, et moins serrée, les angles postérieurs marqués, le rebord un peu plus large et l'extrémité moins arrondie, la callosité basale est convexe, la suture est saillante; la teinte générale est plus métallique et les bords sont plus clairs.

Il me paraît probable que toutes ces formes appartiennent à une même espèce, comme pour le genre *Prostomis*.

Koua-Toun.

Les espèces japonaises de ce genre semblent avoir une forme plus ovulaire. Le *T. marginicollis*, de l'Amérique septentrionale, a les élytres bien plus étroitement marginées, le dos plus inégal, moins finement ponctué et l'écusson brusquement arrondi.

Toxocerus Latouchei n. sp. — Long. 42 mill. — *Oblongo-ovalus, patrum convexus, coeruleus, nitidus, rufo-villosus, prothorace nitidiore, subtus aeneo-crenatus, nitidus, rufo-villosus, abdomine rufo, nitido, segmentis apice dilutioribus, pilis longis adpresso fulcis sat dense vestitus, antennis palpisque obscure rufis; capite dense rugoso, antice truncato et paulo rufescente, angulis valde obtusis, antennis articulis 2 primis crassis, nigropilosus, 1^o infuscato, 2^o minore, globoso, ceteris 3 sat gracilibus, 6 et 7 transversis, clara stipite paulo breviorre; prothorace transverso, elytris paulo angustiore, fere a basi antice angustato, lateribus basi rotundatis, antice recte convergentibus, dorso sat subtiliter punctato, basi utrinque impresso, margine postico medio recto, angulis rotundatis, anticis obtusissimis, dorso fulvo-hispido; scutello orato, apice obtuso, dense punctato, basi impresso, interdum virecente; elytris oratis, post medium leviter attenuatis, apice rotundatis, dorso dense punctato-asperulis, callo postico vix laeviore; subtus pectore asperulo-punctato, metasterno medio denudato et medio sulcato, abdomine subtiliter asperulo, pedibus sat gracilibus, rugosis, longe setosulis, tibiis anticis apice fortiliter exutis bidentatis, tarsis brevibus, articulis 4 primis rufescensibus, transversis, 5^o ceteris conjunctis longiore, tarsis intermedii tibiis longioribus, gracillinis, articulis 1^o et ultimo aequalibus, pedibus posticis longioribus, tibiis apice longe plurispinosis, tarsis tibiis fere duplo longioribus, minus gracilibus, apicem versus leviter crassioribus, articulis 1^o et ultimo aequalibus. — ♀ Major (43 mill.), magis ampla,*

paulo virescens, capite prothoraceque leviter aurosis, antennarum clava minore, tarsis posticis tibiis haud longioribus, segmentis centralibus ultimis late ac profunde angulatim emarginatis.

Ce joli insecte, qui rappelle certaines Amphicomes, diffère du *T. Rothschildii* Fairm., par la massue des antennes courte, mais pour le reste les caractères sont les mêmes; seulement les premiers articles des tarses antérieurs sont plus courts, plus larges, et le dernier n'est pas épaissi. Le *T. Florentini* Fairm., de Lang-Song, est plus grand, le corselet est moins court, plus arrondi à la base et sur les côtés et les tarses sont bien moins longs, les premiers articles des antérieurs moins larges; enfin la massue des antennes est plus grande et se rapproche de celle du *Rothschildii*.

Il résulte de la connaissance de la ♀ du *Toxocerus Latouchei* que le genre *Arrhephora* Fairm. (*Ann. Soc. Ent. Belg.*, 1891, C. R. 3) a été établi sur des ♀ dont les ♂ sont des *Toxocerus*, comme je l'avais pressenti. Il faut donc inscrire les espèces de ce genre comme il suit :

- T. Rothschildii* Fairm.
- T. chalcochryseus* Fairm. (*Arrhephora*).
- T. Florentini* Fairm.
- T. Latouchei* Fairm.
- T. varicolor* Fairm.
- T. corinthius* Fairm. (*Arrhephora*).

Sinochelus limbatus n. sp. — Long. 7 mill. — *Ovatus, supra vix convexiusculus, subitus valde convexus, fuscus, indumento cinereo subtilliter setosulo densissime vestitus, elytrorum parte reflexa verticali fusco-velutina, prothorace plaga media interrupta et plagula antica piceolis transversim fasciata, scutello piceolo, subitus dense cum pedibus minus dense griseo-rillosus; clypeo denudato, rugosulo, transversim paulo concavo, margine antico fere truncato, leviter reflexo, angulis paulo rotundatis; prothorace parum transverso, elytris haud angustiore, convexo, antice paulo angustato, lateribus rotundato, angulis posticis valde obtusis; scutello ogivali; elytris a medio postice angustatis, apice separati rotundatis, lateribus et apice verticalibus; pygidio fere conico, cinereo; pedibus crassis, asperatis, posticis compressis, tibiis anticis dente apicali valido terminatis et supra obtuse angulatis, tarsis posticis crassis, articulo ultimo magno, crasso, unguiculis magnis arcuatim terminato.*

Fou-Tchéou.

Cet insecte a les plus grands rapports avec les espèces africaines du

genre *Dichelus*, mais il en diffère assez notablement par la forme déprimée des élytres que l'abdomen ne déborde pas, par le chaperon largement arrondi, finement rebordé, le corselet coupé droit à la base, les tibias antérieurs terminés par 2 dents, l'apicale grande, allongée, l'autre simplement angulée, les tarses postérieurs, plus épais, surtout le dernier article, les crochets grands, robustes, égaux, la branche interne à peine fissile aux antérieurs et postérieurs et enfin par la vestiture très rare, formée de petites soies ou écailles. L'ensemble de ces différences, joint à la situation géographique, me paraît suffisant pour justifier ce nouveau genre.

A l'espèce précédente il faut ajouter :

1^o le *DICHELUS CHINENSIS* Boh. (*Voy. de la frég. Eugénie*, Entom., p. 52). — Long. 6 mill. — *Oratus, modice convexus, supra dense ochraceo, subtus pallido-squamulosus. antennis, palpis pedibusque testaceis, his breviter pallido-setosis; capite subtiliter crenulato; elytris dorso planis; tibiis anticus nutricis; femoribus posticis compressis, validis.*

Hongkong.

2^o l'espèce suivante trouvée au Tonkin :

Sinochelus cinctipennis n. sp. — Long. 7 mill. — Forme du *limbatus*, mais coloration très différente ; le corps est couvert en dessus de petites écailles d'un roux ocreux, comme le *chinensis*, mais les élytres ont le bord réfléchi d'un brun noir velouté comme le *limbatus*, l'écusson est d'un brun foncé, velouté, avec une ligne brillante, transversale, à la base, il est finement rugueux ; les élytres ont la même forme et sont parsemées, comme chez le *limbatus*, de quelques points très espacés ; le pygidium est d'un jaunâtre très pâle ; le dessous du corps est couvert de poils sétiformes d'un roussâtre pâle ; les pattes sont brunes avec les fémurs rougeâtres, les postérieurs inermes, mais avec les trochanters acuminés.

Haut-Tonkin ; ma collection.

ECTINOPlia SULPHURIVENTRIS Redt. — Cette espèce a été aussi trouvée par M. de Latouche aux environs de Fou-Tchéou en plusieurs exemplaires qui présentent quelques différences avec le type figuré dans le « Voyage de la Novara ». Chez les uns le corselet, au lieu d'avoir le fond noir, est couvert de squamules verdâtres avec 2 bandes dorsales noires et 2 bandes latérales obliques, de même couleur, plus courtes, en outre la bande suturale n'est pas tranchée et se fond avec le reste de l'élytre qui est d'un noir peu intense, poudré de petites écailles verdâ-

tres; chez d'autres, le dessus du corps est d'une couleur purée de pois, n'ayant que des vestiges de bandes sur le corselet et une courte bande noire aux épaules des élytres; les crochets des tarses postérieurs sont très légèrement bifides à l'extrémité.

Ectinoplia latesuturata n. sp. — Long. 8 mill. — *Ovata, crassa, supra planiuscula, fusco-nigra, squamulis sulphureis adpressis fasciata, capite sulphureo-setosulo, prothorace sulphureo, plaga magna discoi-dali antice bifida, utrinque macula oblonga minore comitata denudata, scutello nigro, elytris vitta lata suturali, basi medio et ante apicem transversim ramosa sulphurea, pygidio, corpore subtus et pedibus dense argenteolo-squamulosus; capite subquadrato, antice truncato et reflexo, antennis piceis; prothorace valde transverso, elytris parum angustiore, antice a basi arcuatim angustato, antice fere truncato, basi late ar-cuata, angulis valde obtusis; scutello orato, velutino; elytris breviter oratis, medio leviter ampliatis, apice valde rotundatis, dorso dense sub-tiliter granulatis, callo ante-apicali crasso, cix laeviore; pygidio plano, lato, apice piloso; pedibus sat validis. tibiis tarsisque ciliatis, tibiis anti-cis bidentatis, unguiculis inaequalibus, majore apice fisso, posterioribus magnis, simplicibus.*

Semblé très voisine de l'E. *Paivae*, mais chez celle-ci les pattes et les antennes sont autrement colorées.

Ectinoplia guttaticollis n. sp. — Long. 8 1/2 mill. — *Praecedenti valde affinis, sed angustior, nigro-velutina, opaca, squamulis sulphureis variegata, capite laxe squamosulo, prothorace sulphureo-cineto, vittula media et utrinque puncto sulphureis, elytris linea suturali et utrinque ramulis transversis 3 sulphureis, 2 posticis plus minusve interruptis aut abbreviatis, pygidio, corpore subtus et femoribus indumento squamo-ubido levissime virescente dense vestitis; capite haud quadrato, dense subtiliter strigosulo-rugoso, clypeo angustiore, apice paulo arcuato et magis reflexo; prothorace transverso, elytris valde angustiore, late-ribus cum angulis posticis valde rotundato, angulis anticis paulo pro-ductis; pedibus gracilibus, tibiis anticis tridentatis, dente supero mi-nuto, unguiculis 4 anticis inaequalibus, unguiculo majore apice fisso, unguiculis posticis integris.*

Phyllopertha sublimbata n. sp. — Long. 10 à 12 mill. — *Ovato-oblonga, modice convexa, aenea aut cupreola, griseo-villosa, parum ni-tida, elytris rufescensibus, nitidis, glabris, lateribus fuscculo-violaceo-tinctis, apicem versus latius aut viridi-tinctis; capite cum prothorace fuscculo et fulvo-piloso, dense subtiliter ruguloso-punctato, margine an-*

tico late arcuato, vix reflexo, antennis palpisque aeneis; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus arcuato, antice angustato, dorso dense subtiliter punctato-rugosulo, margine postico late arcuato aut fere recto, angustissime polito, angulis subrectis; scutello brevi, lato, arcuato, punctulato, aeneo aut cupreolo micante: elytris oratis, basi fere truncatis, ad humeros sat angulatis, medio vix ampliatis, sat subtiliter et parum regulariter punctato-substriatulis, striis apice extremo profundioribus, intervallis obsolete plicatulis; propygidio et pygidio densissime coriaceo-punctulatis; subtus subtiliter et inaequaliter asperulo-punctata, segmentis centralibus apice laevioribus et cupreolis, tibiis tarsisque obscurioribus, tibiis anticus bidentatis, unguibus anticus inaequalibus, majore apice bifido, posterioribus dupliribus, simplicibus.

ANOMALA VIRIDICOSTATA Nonfr., Ent. Nachr., 1892, p. 85. — Long. 16 mill. — *Ovata, convexa, nitida, rufo-fulva, capite (clypeo excepto), prothorace (lateribus exceptis), scutello apice, elytrorum sutura elevata et utrinque costis 2 validis laete viridi-metallicis, macula humerali et ad marginem elytrorum externum vitta nebulosa similiter tinctis, pectore et abdomine dilute fusculo-aenescentibus, hoc apice cum pygidio et signaturis lateralibus rufo-fulvis, pedibus levissime aeneo-tinctis, tarsis virescentibus; capite densissime subtiliter punctato, sutura clypeali recta, vix indicata, ad latera elevata, clypeo antice fere recto, angulis rotundatis, antennarum clava vix obscuriore; prothorace sat brevi, basi elytris fere latiore, antice a basi arcuatim angustato, dense subtiliter punctato, paulo rugosulo, antice et basi utrinque obsolete impresso: scutello ogivali, subtiliter rugosulo-punctato: elytris breviter oratis, post medium leviter ampliatis, dorso parum fortiter striatis, sat dense asperulo-punctatis, intervallis 3, 5, 7, 9 elevatis, duobus ultimis breviter, callo humerali sat convexo; pygidio sat conico, subtiliter transversim strigoso, utrinque ad marginem biimpresso; pedibus validis, tibiis anticus apice bidentatis, dente apicali elongato, apice obtuso et paulo incurvo, unguibus externis apice fissis.*

Koua-Toun.

Cette *Anomala* est voisine des *pekinensis* et *testaceipes*, aussi de la Chine, mais la coloration est bien différente, la sculpture plus fine, très serrée, un peu rugueuse, même sur les côtés des élytres, qui sont plus courtes, le corselet est plus large, et les pattes sont plus robustes.

Cosmiomorpha similis n. sp. — Long. 18 mill. — Forme, sculpture et coloration de *C. modesta* Saund., mais plus petite et couverte de soies rousses très serrées, notamment sur le corselet; la tête est

plus finement rugueuse, rétrécie en avant avec les côtés un peu arqués, relevés, la partie antérieure légèrement concave avec le bord faiblement sinué et les angles arrondis, le labre est couvert d'une villosité rousse serrée; le corselet moins en carré transversal, plus rétréci en avant, très légèrement élargi à la base, couvert en dessus de rugosités fines très serrées et d'une vestiture roussâtre très serrée formée de poils courts sétiformes, le bord postérieur est largement et faiblement sinué devant l'écusson, les angles postérieurs sont plus arrondis et il n'y a pas une fine ligne élevée au milieu de la base; l'écusson est aussi rugueusement ponctué; les élytres sont moins atténuerés en arrière, les côtes sont plus saillantes; le pygidium est plus conique, plus rétréci vers l'extrémité et il est couvert, sur une ponctuation densément rugueuse, de poils sétiformes roussâtres serrés; le dessous et les pattes sont de couleur marron, les côtés sont couverts d'une villosité beaucoup plus fine, moins serrée, les pattes sont plus rugueusement ponctuées, les tibias antérieurs ne sont pas dentés chez le ♂, plus larges et obtusément tridentés chez la ♀, leurs tarses sont très allongés aussi, mais le 1^{er} article est simple, semblable au 2^e, tous deux rugueusement ponctués.

Formose.

Dicerca Latouchei n. sp. — Long. 12 mill. — *Oblonga, parum convexa, postice attenuata, tota aeneo-metallica, cupreo-mixta, sat nitida, glabra; capite brevi, densissime subtiliter ruguloso-punctulata, cupreomicans, inter oculos plagulis 2 leviter convexis, minus rugosis et obscurō-aeneis, clypeo profunde et arcuatim emarginato, labro rugoso, cupreō; prothorace transverso, longitudine duplo latiore, antice a medio paulo angustato, fortiter punctato-rugoso, inaequali, medio canaliculato et cupreō, utrinque vitta convexa fusco-metallica, fere polita, lateribus late impressis et plagula polita fusco-metallica signatis, extus magis rugatis, margine postico medio reflexo, polito, utrinque minus, angulis rectis; scutello minuto, rotundato, medio impresso, obscuro; elytris oblongo-ovatis, ad humeros obtusis, postice vir sensim ampliatis, apice angustatis et subproductis, apice ipso truncato, leviter bispinoso, spina interna minutissima, sutura anguste elevata, utrinque costulis aliquot sat irregularibus, 1^a fere integra sed postmedium oblitterata, 2^a basi et post medium distincta, ceteris valde interruptis, intervallis valde punctato-rugosis, plagulis leviter virescentibus impressiusculis; subtus cum pedibus cuprea, nitida, rugosa, prosterno lato, cum meso- et metasterno medio paulo concavo et virescente, tarsis coeruleis.*

Amoy.

Sandalus chinensis n. sp. — Long. 12 mill. — *Oblongus, converrus, piceo-fuscus, vir nitidulus, prothorace fuliginoso-puberulo, ad latera densius, elytris dilute piceolis, basi et apice dilutioribus, glabris; capite reclinato, opaco, fuso, brevissime puberulo, subtilissime asperulo, medio obsolete costulato, inter oculos leviter late impresso, clypeo brevi, cum labro dense lutoso-puberulo, tuberculis antennariis conico-productis, antennis brevibus, fuscis, articulo 1^o crasso, 8 ultimis brevissimis, densatis, dense flabellatis, mandibulis validis, abrupte arcuatis; prothorace parum transverso, basi elytrorum haud angustiore, antice valde angustato, basi levissime ampliato, margine antico rotundato-producto, caput obtegente, dorso dense subtiliter punctulato, basi medio leviter biimpresso, margine postico utrinque sinuato, medio ad scutellum leviter emarginato et bidenticulato; scutello fere rotundato, apice acuminato, dense punctulato, linea media elevata; elytris oblongo-ovatis, ad humeros obliquatis, dein ampliatis, sutura et utrinque costulis 3 sat elevatis, externa breviore, intervallis sat grosse punctatis, paulo rugosulis et laxe reticulatis, ertus lineis 2 vir elevatis, margine sat crassa; subtus cum pedibus piceis, cinereo-pubescentis, tibiis anticus ertus subtiliter denticulatis, apice valde calcaratis, tarsis late lamel-latis.*

Koua-Toun ; un seul ♂.

C'est une découverte fort intéressante, le genre n'étant encore signalé, à ma connaissance, qu'en Amérique et en Afrique.

Ponyalis n. gen.

Ce genre ressemble au genre *Lyponia*, mais il en diffère par un corps plus solide, le corselet très transversal, presque rectangulaire, plus étroit que les élytres, sans aréoles, n'ayant au milieu qu'un sillon bien marqué en arrière, se changeant en avant en une carène, les côtés ayant 2 fortes impressions, les angles postérieurs coupés droit mais émoussés ; les antennes dépassant au moins le milieu du corps, atteignant même les 2/3, et, à partir du 3^e article, portent des lamelles larges, qui se rétrécissent peu à peu vers l'extrémité ; les élytres ont chacune 4 fortes carènes, outre la suture, les interstices sont remplis par des fossettes transversales, serrées, qui, chez le ♂, sont séparées longitudinalement par une fine ligne un peu saillante ; les pattes sont courtes, comprimées. Chez la ♀ les antennes sont bien plus courtes et les interstices des élytres sont à peine séparés en deux parties par une ligne longitudinale faiblement saillante.

P. laticornis n. sp. — Long. 10 à 14 mill. — *Elongata, fere pa-*

ralleta, nigra, nitida, prothoracis lateribus late, basi et antice angustissime elytrisque rubris, subtus nitidior, antennis nigris, opacis, articulo 1^o nitido; capite brevi, inter oculos transversim sulcato, his globosis, exsertis, tuberculis antennariis elevatis, antennis elongatis, articulo 2^o minutissimo, ceteris late lamellatis; prothorace transverso, subquadrato, ad angulos anticos tantum angustato et rotundato, margine antico arenato, dorso medio postice sulcato, antice carinato, utrinque antice late impresso, transversim plicatulo, postice iterum transversim impresso, angulis posticis obtuse rectis; scutello subquadrato, truncato aut leviter emarginato: elytris sutura et utrinque costis 4 elevatis, 2^a et 4^a apicem attingentibus, interstitiis transversim foreolatis et medio linea longitudinali paulo elevata divisis; subtus lateribus impressa; ♀ minor, prothorace latius rubro-marginato, elytrorum interstitiis minus divisis, antennis brevioribus, angustius lamellatis.

Koua-Toun.

Cet insecte est assez distinct par son corselet qui n'est pas élargi à la base dont les angles sont droits mais émuossés et par ses antennes lamellées qui le rapprochent de l'*Atelius expansicornis*, tandis que le corselet non aréolé, à angles postérieurs non prolongés, lui donnent de la ressemblance avec les *Lyponia*.

Rhagophthalmus gibbosulus n. sp. — Long. 8 1/2 mill. — *Oblongus, elytris a basi longe attenuatis, convexiusculus, fuscculo-piceus, nitidulus; capite lato, oculis magnis, late ac profunde emarginatis, fronte angusta, paulo concava, antennis ferrugineis, brevibus, prothoracis marginem anticum eix superantibus; prothorace transverso, brevi, elytris vir angustiore, antice a basi angustato, dorso transversim fortiter convero, postice impresso, margine postico medio sinuato et rufescente, utrinque sinuato, angulis lati, obtuse retroversis; scutello rufescente, oblongo, apice obtuso; elytris elongatis, basi paulo ampliatis, dein attenuatis, dense subtiliter rugosulis, utrinque tricostulatis, costis 2 primis sat acute elevatis, 3^a paulo obsoleta, sutura haud elevata, margine externo dense rufo-ciliato; subtus rufescens, abdomine magis castaneo, segmentis abdominalibus rufo-marginatis, pedibus fuscis, femoribus rufo-testaceis.*

Ressemble beaucoup au *scutellatus* Motsch., mais plus petit, avec les élytres bien plus atténues en arrière, plus acumérées, à côtes saillantes; le corselet est relevé transversalement au milieu, les antennes sont plus courtes ainsi que l'écusson.

Podabrus angustus n. sp. — Long. 7 1/2 mill. — *Elongatus, pa-*

rum converrus, fuscus, opacus, prothorace rufo; capite fere transverso, basi fortiter angustato, ad oculos dilatato, his sat mediocribus, ertus productis, fronte subtiliter alutacea: antennis validiusculis, ab oculis paulo distantibus, inter se sat approximatis, squalide fulvis, articulo 1^o elongato, 2^o tertio breviore; prothorace parvo, elytris dimidio angustiore, subquadrato, antice levissime attenuato, lateribus fere rectis, anguste marginatis, basi recta, angulis rectis, anticis vir obtusis, dorso laeri, medio sat convexo, postice fere triangulariter impresso et punctulato; scutello minuto, triangulari; elytris elongatis, basi truncatis, ante medium postice leviter attenuatis, dorso alutaceis, sutura et utrinque lineolis 2 levissime elevatis; pedibus sat gracilibus, squalide lutes.

Fo-Kien.

Telephorus confusus n. sp. — Long. 43 mill. — *Elongatus, subtus cum pedibus fusculo-coeruleus, fulvo-pubescentis, abdomine rufo, supra et subtus lateribus fusco-maculato, capite nitide coeruleo, fere laevi, fronte impressiuscula, clypeo punctulato, medio convexo, utrinque impresso, palpis rufis, articulo ultimo fuscato, antennis infuscatis, articulis 3 primis subtus fulvis, apice et supra cinereo-pubescentibus, basi crassioribus, articulis 2^o et 3^o aequalibus, 4^o et sequentibus longioribus; prothorace elytris paulo angustiore, valde transverso, subquadrato, rufo-flavo, nitido, disco fusculo-coeruleo-bimaculato, lateribus fere rectis, ad angulos anticos rotundatis, margine antico levissime arcuato, postico late sinuato et paulo reflexo, angulis obtusissimis; scutello aeneidente, densissime subtiliter granulato, dense fulro-villoso, apice obtuso; elytris basi ampliatis, dein gradatim attenuatis, apice fortiter rotundatis, dense granulatis, coerulecenti-viridis, opaculis, basi excepta valde nitida, sutura et utrinque nervulis 2 paulo elevatis; pedibus robustis, tarsis nigriventibus, articulo 4^o integro, unguibus validis*

Fou-Tchéou.

Ce pourrait bien être l'insecte dont parle M. Gorham, à la suite de la description du *T. nobilis* et qui provient du nord de la Chine; mais la description de cette dernière espèce indique le métasternum seul comme d'un noir verdâtre et ne parle pas de la longueur relative des articles des antennes.

Telephorus hypopelius n. sp. — Long. 46 mill. — *Elongatus, sat robustus, flavo-testaceus, capite profunde coeruleo, valde nitido, margine antico arcuato, flavo-testaceo, clypeo medio convexo, fronte laeri,*

inter oculos vix distincte impressiuscula, ore palpis antennisque testaceo-flavida, mandibulis apice paulo infuscatis, antennis medium corporis vix attingentibus, basi paulo crassiusculis, apicem versus gracilioribus, articulis 3 primis aequalibus; prothorace elytris angustiore, valde transverso, longitudine dimidio latiore, transversim subquadrato, margine antico late arcuato, dorso polito, marginibus oblonge impresso, postico late sinuato, playa magna discoidali transversa fusco-coerulea, angulis obtusis, posticis fere rotundatis; scutello fuso, apice pubescente, basi coerulecente; elytris elongatis, post medium attenuatis, coerulecenti-viridibus, metallicis, sat fortiter dense rugosulis, parum nitidis, sed basi luevioribus, valde nitidis, sutura et utrinque nervulis 2 modice elevatis et extus 2 obsoletis; metasterno fusculo-coerulecente, griseo-puberulo, lateribus flavidis, abdome cum pedibus flavo-testaceis, femoribus apice et tibiis basi infuscatis, tarsis latis, articulo 4° integro, unguibus simplicibus.

Diffère du précédent par la taille plus forte, la tête entièrement bleue sauf une bordure rousse antérieure, les antennes plus courtes, le corselet plus large, plus arrondi aux angles postérieurs, la tache plus grande, les nervures des élytres plus saillantes, le métasternum verdâtre, les pattes rousses avec la plus grande partie des fémurs brune.

Telephorus hemixanthus n. sp. — Long. 43 à 46 mill. — *Fulvo-flavus, capite basi cum fronte coerulecenti-viridi, nitidissimo, clypeo utrinque impresso, palpis antennisque fulvo-flavis, his articulo 3° secundo et quarto multo brevioribus; prothorace transversim quadrato, macula dorsali transversa fuscculo-violacea, lateribus fere rectis, margine antico late arcuato, dorso laevi, utrinque longitudinaliter impresso, antice latius, postice transversim impresso, basi late sinuata, fortiter cum angulis marginata, his et anticis rotundatis; scutello coeruleo, apice fusculo, elevato et pubescente; elytris fere parallelis, viridi-coerulecentibus, modice nitidis, dense sat fortiter rugoso-punctatis, basi minus rugosis et valde nitidis, sutura et utrinque nervulis 2 paulo elevatis; metasterno pubescente, interdum levissime aenescente, pedibus mediocribus, femorum apice et tibiarum basi fuscis, his interdum cum femoribus supra fusco-lineatis, tarsorum articulo 4° vix sinuato, unguibus simplicibus.*

La description du *T. Leechianus* Gorh. lui conviendrait assez bien, mais la taille est plus forte, le corselet serait carré avec une tache presque ronde, les élytres d'un vert brillant; la description ne parle pas des articles des antennes ni des crochets tarsiens.

Telephorus fraternus n. sp. — Long. 43 mill. — Ressemble à

l'hypopeltis pour la coloration générale, mais plus petit, avec les élytres assez fortement rétrécies presque dès la base et assez déhiscentes, le chaperon n'est pas bordé de fauve en avant, les antennes dépassent un peu le milieu du corps, sont brunes avec les 3 premiers articles un peu roussâtres en dessous, les 2^e et 3^e égaux, le 4^e plus long; le corselet est semblable avec le bord postérieur plus fortement sinué; les élytres présentent la même sculpture, mais sans nervures distinctes, sauf à la base, la suture un peu saillante et à la base seulement; toute la poitrine est d'un bleu brunâtre, pubescent, ainsi que les pattes qui sont plus robustes, le 4^e article des tarses est faiblement bilobé et les crochets, assez petits, sont simples.

Fou-Tchéou.

Ces deux espèces sont voisines du *T. Berti*, du Thibet; mais ce dernier a les élytres d'un violet cuivreux, les antennes et les pattes noires, la tête ponctuée, impressionnée, le corselet canaliculé, et le dessous du corps d'un bleu noir ou bronzé.

Telephorus bigibbulus n. sp. — Long. 43 à 44 mill. — *Elongatus, totus flavido-testaceus, parum nitidus, elytris vix nitidulis: capite sat lato, fere laevi, inter oculos impressiusculo, his nigris, clypeo fere truncato, ciliato, antennis gracilibus, apice gracilioribus, corpore vix brevioribus ♂, fusculis, articulis 2 primis, sequentibus basi et interdum ultimis flavidis: prothorace elytris paulo angustiore, subquadrato, lateribus fere parallelis, dorso posicte convexo, laevi, medio sulcato, antice transversim planiusculo et utrinque impresso, angulis anticis rotundatis, basi recta, angulis plus minusve rectis; scutello lato, triangulari, laevi, apice obtusiusculo; elytris elongatis, post medium attenuatis, ad humeros angulato-rotundatis, apice obtusis, dorso subtiliter coriaceis et dense pubescentibus, sutura et utrinque lineolis 3 vel 4 levissime elevatis; pedibus sat magnis, sat validis, coxis prominentibus, tibiis levissime costulatis, tarsorum articulo penultimo integro, unguibus validis, arcuatis.*

Resssemble au *tividus* pour la forme et la coloration générale, mais le corselet a plus d'analogie avec celui de *Rhagonycha rufidens*, de Corse.

Telephorus monochrous n. sp. — Long. 42 mill. — Coloration du *bigibbulus*, mais plus petit et très différent par la forme du corselet qui est de moitié plus large que long, arrondi sur les côtés qui sont largement rebordés avec les angles postérieurs très arrondis ainsi que les antérieurs, le dos est un peu convexe en arrière, à peine impressionné longitudinalement au milieu; la partie antérieure présente, au

milieu, une petite ligne élevée et, de chaque côté, un sillon un peu oblique peu marqué; les antennes sont grèles, brunâtres, avec les 2 premiers articles fauves et atteignent les 3/4 de la longueur du corps; les élytres sont moins allongées, un peu élargies en arrière, arrondies à l'extrémité, finement alutacées avec l'extrémité un peu coriacée, la suture et 3 lignes, de chaque côté, un peu élevées, l'externe distincte seulement à la base; le dernier segment ventral est bi-impressionné et légèrement sinué à l'extrémité; le 4^e article des tarses est profondément bilobé, les crochets sont simples.

Telephorus foveicollis n. sp. — Long. 10 à 11 mill. — *Elongatus, postice attenuatus, fusco-ardesiaceus, vix nitidulus, subtiliter pilosus, prothorace flavido, nitido, prosterno et mesosterno pedibusque cum coris flavido-testaceis, clypei marginibus et ore similiter coloratis, antennis fuscis, articulis 4 primis flavido-testaceis; capite lato, dense subtiliter coriaceo, medio linea obsolete impressa, paulo aenescente, mandibulis apice aenis, antennis sat gracilibus, corporis medium, fere attingentibus, articulis 2 et 3 aequalibus; prothorace quadrato, angulis anticis rectis, posticis rotundatis, dorso glabro, fere laeri, antice dilutiore, antice utrinque late fortiter impresso, medio hanc sulcato, margine antico late arcuato, postico medio late sinuato; scutello triangulari, subtiliter asperulo, apice obtuso: elytris ante medium postice attenuatis, subtiliter dense granulatis, basi paulo denudatis et nitidioribus; abdome opaco, pectore interdum nitido et coerulecente: pedibus mediocribus, tarsis paulo obscurioribus, unguibus simplicibus.*

Telephorus limbolarius n. sp. — Long. 8 mill. — *Modice elongatus, parum concrevus, lutoso-fulvus, nitidus, elytris piceolis, parum nitidis, fulvo-pilosulis, sutura et margine externo angustissime fulvis et longius puberulis; capite laeri, ad antennarum basin intus impressiunculo, oculis globosis, integris, antennis corpore hanc brevioribus, basi parum gracilibus, apicem versus attenuatis, infuscatis, articulo 1^o (apice excepto) lutoso-fulvo, articulo 2^o tertio dimidio breviore, 3^o quarto paulo breviore; prothorace transverso, elytris hanc angustiore, antice vix angustiore, lateribus impressis, deplanatis, antice cum angulis et margine antico rotundatis, dorso concrevo, antice et postice transversim impresso, postice fortius, subtiliter alutaceo, medio obsolete sulcato, angulis posticis obtuse rotundatis; scutello apice obtuso; elytris parallelis, apice obtuse rotundatis, subtilissime coriaceis, sutura basi et utrinque lineolis 2 vix elevatis, tarsis sat validis, infuscatis, articulo 4^o integro, unguibus rufis, simplicibus.*

Telephorus sanguinosus n. sp. — Long. 9 à 11 mill. — *Elongatus, postice attenuatus, fusculus, opacus, subtiliter rubiginoso-pubescent, elytris rubris, dense rubro-pilosulis, prothorace castanecente, lateribus pallido-marginato; capite subtiliter coriaceo, vertice obsoleti impresso, utrinque ante oculos macula pallida subresiculata signata, clypeo basi transversim fortiter sulcato, antice arcuato et anguste pallido, antennis gracilibus, nigris, 2.3 corporis attingentibus, articulis 3-8 apice brevissime pallidis, articulo 2° fere medium tertii attingente; prothorace transverso, elytris angustiore, antice parum angustiore, disco postice sat fortiter convexo, medio sulcato, lateribus paulo deplanatis et leviter reflexis, basi transversim sulcata, angulis rotundatis; scutello triangulare, fusco; elytris ante medium postice attenuatis, apice fere truncatis, dorso fere levibus, sutura elevata, utrinque nervulis 2 vix distinguendis; subtus subtiliter fusculo-metallico-pruinosus, coris, femoribus tibiisque subtus rufescentibus, unguibus simplicibus.*

Idgia foveifrons n. sp. — Long. 7 mill. — *Elongata, sat convexa, subtus cum capite et pedibus aeneo-vertens, sat nitida, prothorace rufo, elytris coeruleis, minus nitidis, dense subtiliter griseo-pubescentibus; capite subtiliter rugosulo-punctato, summo multo densius, inter oculos transversim fortiter foveato, lateribus antice marginatis, clypeo rufescente, cum labro densissime subtiliter punctulato, antennis palpisque testaceo-rufis, illis elongatis sed parum gracilibus; prothorace elytris angustiore, longitudine vix latiore, medio modice ampliato, dorso punctulato, medio sat fortiter sulcato, lateribus antice cum angulis et margine antico rotundatis, nigro-ciliatis, basi fere recta, marginata, ad angulos sat fortiter transversim impressa, his rotundatis et marginatis; scutello viridi, dense subtiliter rugosulo, medio arenatim impresso; elytris elongatis, basi paulo ampliatis, dein leviter attenuatis, subtiliter dense granulatis, sutura et utrinque lineis 3 parum elevatis, his granulis majoribus distantibus ornatis, lateribus fuso-ciliatis, margine exterioro angustissime virescente; subtus subtiliter coriacea, cum pedibus griseo-pilosula.*

Tamsui (île Formose).

Resssemble à *I. longula* Fairm., du Tonkin, mais plus petite, avec les élytres moins longues, plus bleues, le corselet plus nettement sillonné au milieu, la tête ponctuée, avec les yeux plus rapprochés et l'impression arquée.

Nyctobates microcephalus n. sp. — Long. 20 mill. — *Elongatus, modice convexus, niger, vix nitidulus; capite sat parvo, parce subtiliter*

punctulato, collo densius ac fortius, rugosulo, a fronte plica transversali obsolete separato, oculis transversis, fere integris, antennis brevibus, prothoracis basin haud attingentibus; prothorace valde transverso, elytris parum angustiore, convexo, antice declivi, antice vix angustiore, lateribus leviter arcuatis, basi vix sensim sinuatis, anguste marginatis, dorso subtiliter parum dense punctulato, angulis anticis rotundatis, basi late obsolete bisinuata, medio sat fortiter, extus tenuiter marginata, angulis acute retroversis; scutello triangulari, fere laevi, apice paulo obuso; elytris oblongis, ad humeros rotundatis, postice haud ampliatis, apice obtusis, sat subtiliter striato-punctulatis, stria marginali sat profunda, apice sulcata, intervallis planis, fere laevibus; subtus (prosterno excepto) cum pedibus nitidior, prosterno inter coxas lato et profunde bisulcato, mesosterno sat lato, vix impresso, metapleuris subparallelis, subtilissime punctulatis, abdome subtiliter strigosulo, lateribus impresso, pedibus sat gracilibus. tibiis anticis apice paulo incurvis, posticis rectis.

Resssemble assez au *valgipes*, du Japon, mais bien plus petit, avec le corselet plus large, à peine bisinué à la base, les antennes et les pattes plus grèles, les tibias antérieurs à peine arqués.

Camaria microdera n. sp. — Long. 28 mill. — *Oblonga, postice ampliata, convexa, viridi-aenea, nitida, capite, prothorace medio et sutura basi purpureo-tinctis; capite sat dense et sat fortiter punctato, vertice minus, clypeo antice late sinuato, angulis acutis, sutura clypeali profunda; prothorace transverso, elytris fere dimidio angustiore, antice leviter angustato, lateribus fere rectis, dorso sat dense, ad latera densius punctato, basi fortiter marginata, angulis acute extroversis, anticis obtusis; scutello sat minuto, aeneo, obtuso; elytris amplis, postice paulo ampliatis, sat fortiter striatis, striis coeruleis, basi punctulatis, apice obsolete, intervallis planiusculis, subtiliter punctulato-rugosulis, ad suturam eridentius; subtus aurulenta, valde nitida, abdome apice coeruleo, pectoris lateribus punctatis, abdome subtiliter dense coriaceo, lateribus impressis et impressionibus coeruleis, pedibus sat magnis, punctatis, cupreis, genibus coeruleis.*

Resssemble beaucoup à la *spectabilis* Pase., du nord de la Chine, mais la coloration est plus verte, uniforme, le corselet plus étroit, plus convexe, moins grossièrement ponctué, à peine rugueux sur les côtés, les élytres sont plus longues, plus atténuées en arrière, et le prosternum est plan entre les hanches et en avant.

Cistelomorpha nigrosparsa n. sp. — Long. 15 mill. — *Orato-*

elliptica, valde convexa, aurantiaca, opacula, elytris flaris, nitidis, a medio postice maculis nigris confluentibus, disco magis aggregatis, ante medium maculis minutis 3 vel 4 sparsutis; capite sat subtiliter dense et fere rugose punctato, inter oculos sulcato, sutura clypeali fortiter impressa (antennis fractis); prothorace elytris angustiore, sat transverso, a basi fere antice angustato, angulis anticis nullis, basi fere recta, angulis fere rectis, dorso laevi, medio obsolete sulcatulo, basi transversim obsolete striato; scutello obscure rufo, apice obtuso; elytris amplis, oblongo-oratis, apice obtusis, dorso parum profunde punctulato-striatis, intervallis leviter convervis, subtiliter punctulatis; subtus cum pedibus aurantiaca, metasterno apice nigro-maculato.

Yunnan Nord; coll. R. Oberthür et la mienne.

Cette espèce est bien distincte de ses congénères par sa coloration, les taches noires marbrant toute la partie postérieure des élytres qui sont d'un jaune clair brillant, le reste du corps étant d'un roux orange.

Cistelomorpha bina n. sp. — Long. 9 mill. — *Oblongo-ovala, convexa, flava, vix nitidula, oculis, antennis (articulo 10^e excepto), segmentis abdominalibus 2 ultimis nigris, tibiis fuscis, tarsis obscuris, elytris utrinque ante apicem macula ovalula nigra ornatis; capite minuto, antice anguste producto, subtiliter dense punctulato, sutura clypeali impressa, palpis castaneis, antennis sat gracilibus, articulis 4-11 arquilibus, 3^e ceteris longiore; prothorace transverso, elytris vix angustiore, antice fortiter angustato, lateribus basi rotundatis, basi rectis, angulis subobtusis; scutello subtriangulari; elytris ovalis, sat fortiter striatis, striis subtiliter punctulatis, intervallis leviter convexis, subtilissime coriaceis; subtus paulo obscurior, pubescens.*

Formose, cap Sud.

Ressemble à *Taxillaris* Fairm., mais bien plus courte, sans taches axillaires, avec les antennes noires, sauf les 2 premiers articles, le corslet plus arrondi sur les côtés qui sont plus tranchants, avec une impression oblongue bien marquée au milieu de la base et les élytres à stries régulièrement distantes, marquées d'une petite tache noire avant l'extrémité; la coloration générale est un peu roussâtre, les pattes brunes, sauf les fémurs.

Cistelomorpha atripes n. sp. — Long. 13 mill. — Forme de la précédente, mais plus grande et un peu plus allongée, jaune avec l'abdomen un peu roussâtre, les palpes, les antennes, les tarses et les tibias avec les genoux noirs, une tache noire sur la base des fémurs;

la tête est plus longue, plus atténuee en avant, formant presque un museau, le labre très grand, légèrement sinué, le corselet est plus long, la sculpture est encore plus fine, les stries des élytres sont un peu plus fines et les interstries plus plans; l'extrémité de l'abdomen est plus brillante que le reste.

Koua-Toun.

Resssemble à l'*Apicipalpis* Fairm., de Kouï-Tchéou, mais plus allongée, avec les palpes et les antennes entièrement noirs, les pattes d'un noir plus intense, les fémurs ayant une tache noire sur la base.

Cistelomorpha infranigra n. sp. — Long. 40 à 42 mill. — *Oblongo-elongata, sut fortiles convexa, supra flavo aut sulphurea, vix nitidula, capite et corpore subtus cum pedibus (femoribus exceptis) nigris, palpis et antennis totis nigris; capite ovato, densissime subtiliter rugosulo-punctato, antennis corporis medium attingentibus; prothorace elytris angustiore, antice a basi angustato, lateribus rectis, basi medio obtusissime angulato, angulis fere rectis; scutello obscuro, pubescente; elytris elongatis, striatis, striis vix punctulatis, intervallis vix convexiusculis, suturali ceteris angustiore: subtus subtiliter fuliginoso-pubescentes, genubus nigris.*

Resssemble à l'*Hypocrita* Mars., du Japon, mais un peu moins étroite et d'une coloration très différente pour la tête et le dessous du corps, les antennes sont moins longues et moins grèles, le corselet est plus court et l'écusson de couleur foncée.

Chlorophila Carolina n. sp. — Long. 43 mill. — La description de la *C. nitidicollis* Fairm., du Darschilling, lui conviendrait parfaitement; la coloration est presque la même, d'un vert mat, mais la bande jaune marginale est moins tranchée, effacée à la base, le corps est plus étroit, le corselet du mâle est presque cylindrique, à peine un peu élargi au milieu chez la ♀, l'écusson est extrêmement petit, concolore, et les élytres, plus étroites, paraissent plus longues. La tête est plus inégale, rugueuse, sans un gros point au milieu; le rebord basal du corselet est plus fort, non interrompu au milieu; les stries des élytres sont à peu près indistinctes et la bordure jaune ne remonte pas jusqu'à la base; enfin le dessous est d'un vert métallique clair avec les pattes, y compris les hanches, d'un roussâtre fauve, les genoux bruns, l'extrémité des tarses enfumée, les deux derniers segments ventraux sont roux, le mésosternum et la pointe du prosternum le sont également; les antennes sont brunes.

Chlorophila Semenowi n. sp. — Long. 13 mill. — Ressemble assez à la précédente, mais le corps est plus étroit, les élytres sont plus acuminées, proportionnellement plus étroites, la coloration est d'un vert brillant, métallique, avec quelques reflets dorés, un peu moins brillante sur la tête et le corselet, la bande marginale jaune est encore moins tranchée, presque confondue, le dessous du corps est plus brillant avec des reflets dorés, le dernier segment également roux, les pattes et les antennes sont rousses, les genoux sont très brièvement brunâtres; le corselet est semblable, l'écusson rugueux et doré; les élytres très acuminées sont plus fortement ponctuées, plus rugueuses, avec la suture et quelques lignes élevées plus saillantes; le métasternum est impressionné au milieu de la partie postérieure.

Nemostira rugulicollis n. sp. — Long. 13 mill. — *Elongata, convexiuscula, squalide fulva, sat nitidula, fulvo-hirtula, capite prothoraceque paulo obscurioribus, subtus cum pedibus piceola, nitidula; capite sat breri, rugosulo, inter oculos oblonge impresso, antice laeviore, punctato, sutura clypeali profunda; oculis magnis, haud emarginatis, parum distantibus, labro magno, lato, punctato, truncato, antennis gracilibus, piceis, corporis medium attigentibus, articulis 2^e et 3^e aequalibus; prothorace ovatulo, elytris dimidio angustiore, postice paulo constricto, antice lateribus sat rotundato, basi fere recta, anguste marginata, angulis extus productis, dorso sat fortiter sat dense punctato: scutello apice obtuso, laevi, transversim impresso; elytris elongatis, ad humeros rotundatis, apice acuminatis, dorso paulo punctulato-striatus, intervallis planiusculis, laxe et irregulariter punctatis; pectore valde punctato, metasterno medio laevi, abdomine laeviusculo, pedibus sat elongatis, sat gracilibus, tarsis subtus pilosis, articulo 4^e paulo bilobato, dilatato, 5^e armato, sat elongato.*

Ressemble assez à la *nuea* Fairm., de Java et de Sumatra, mais plus petite, plus étroite, d'une coloration plus pâle, avec les antennes plus grêles, filiformes, à 2^e article moins court, le corselet plus étroit, fortement ponctué, et les élytres finement striées, les interstries à peine convexes.

Hylobius longulus n. sp. — Long. 9 à 11 mill. (*rostr. exel.*). — *Paulo elongatus et compressus, convexus, piceolo-vinosus, capite prothoraceque obscurioribus, elytris pilis squalide griseis parum regulariter et anguste fasciolatis; capite subtiliter punctato et punctis majoribus sparsuto, inter oculos foreola minuta signato, rostro crasso, fortius punctato, apice paulo latiore et oblique reflexo, basi asperulo, antennis*

sat crassis, funiculi articulis 2 primis aequalibus, clava sat crassa orata, acuminata, articulo 1^o distincto, brevi, transverso; prothorace latitudine vix longiore, elytris angustiore, medio leviter ampliato, antice paulo magis quam postice angustato, dorso valde rugoso-plicato, basi recta, medio et ad angulos pilis fulvidis anguste signata; scutello semi-circulari, similiter densius piloso; elytris oblongis, basi truncatis, ad humeros angulatis, postice levissime attenuatis, foveolis oblongis regulariter seriatis, ad 2/3 postice seriebus sulcatis, haud foveolatis; intervallis elevatis, externis praesertim, sub callis posticis sat fortiter impressis, his sat convexis, sutura haud elevata; subtus grosse punctatus, punctis setigeris, abdomine minus punctato, magis setuloso, pedibus vinosis, griseo-pilosulis, femoribus clavatis, apicem versus obtuse dentatis, tibiis apice fuscatis et unco arcuato armatis.

Alcides lobipennis n. sp. — Long. 9 mill. (*rostr. excl.*). — *Sat elongatus, convexus, fuscus, prothorace opaculo, vittis 3 fulrido-pilosulis angustis ornato, elytris paulo nitidulis, maculis minutis griseo-pilosulis sparsutis; capite sat dense subtiliter rugosulo-punctato, inter oculos impresso, rostro elongato, prothorace longiore, vix arcuato, dense sat subtiliter punctato, apice laevi, nitidissimo et paulo latiore, antennis gracilibus, sat brevibus, funiculi articulis 2 primis elongatis, subaequalibus, clava crassa, orata, acuminata; prothorace parum transverso, elytris paulo angustiore, antice gradatim angustato, lateribus leviter arcuatis, dorso granulis laevis sat dense obsito, intervallis parce griseo-pilosulis, parte antica breviter ac subtiliter punctata, basi medio acute producta et utrinque fortiter arcuato-emarginata; scutello minusculo; elytris oblongis, basi fortiter laminato-lobatis, ad humeros obtuse angulatis, dein leviter attenuatis, profunde ac grosse seriato-punctatis, punctis fere ovalis, suturam versus linea tenui conjunctis, intervallis fere planis, subtilissime asperulis et leviter transversim undulatis, lobis fere laevis; subtus punctatus, maculis minutis griseo-pilosulis cum pedibus sparsuto, pedibus mediocribus, anticis longioribus, femoribus subtus fere medio dente acuto armatis, tibiis anticis intus medio obtuse angulatis, tarsorum articulo penultimo lato, bilobato.*

Extrêmement voisin de l'*A. erro* Pasc., du Japon, s'en distingue par le rostre plus grêle, le corselet plus finement granuleux avec 3 bandes longitudinales de poils grisâtres, les élytres à séries de points ovalaires, ne formant pas de fossettes, bien moins gros et moins serrés, mais unis par de fines stries avec les intervalles unis; le corselet est un peu plus étroit.

Mecocorynus tuberosus n. sp. — Long. 14 mill. (*rostr. excl.*). —

Oblongo-ovatus, crassus, dorso planiusculus, niger, opacus; capite convexo, fere laevi, a rostro striola angulata separato, hoc elongato, gracili, basi paulo crassiore, arcuato, basi subtiliter striolato et punctulato, antennis sat gracilibus, concoloribus, funiculi articulo 1^o secundo parum breviore, 2^o et 3^o subaequalibus, ceteris brevibus, clava apicali oblongo-ovata, sat acuminata; prothorace elytris angustiore, longitudine haud latiore, antice a medio angustato, postice vix sensim attenuato, dense foreato, intervallis carinulatis, antice medio breviter carinato, margine postico fere recto, angulis paulo retroversis; scutello ogivali, paulo depresso, laevi; elytris basi prothorace fere duplo latioribus, ad humeros obtuse expansis, postice tantum attenuatis et fortiter declivibus, dorso dense foreis seriatis, intervallis elevatis, 3^o basi, medio et post medium. 5^o post basin et ante medium tuberculo atro, breviter ovato ornatis, 5^o ante apicem tuberculo minore signato, callo humerali simili, sutura postice tantum paulo elevata; subtus foreolatus, foreolis minoribus, mesosterno sulcato, abdomine cinereo-pubescente, femoribus valde clavatis.

Forme du *varipes* Wied., mais moins convexe, plus court, entièrement noir avec le corselet couvert de grosses fossettes serrées, les côtés très arrondis au milieu, un peu sinués à la base, les élytres à lignes de fossettes serrées, les intervalles alternes plus relevés, ayant de gros tubercules veloutés, le dessous du corps très granuleux et les fémurs plus fortement claviformes.

Balaninus tenuesparsus n. sp. — Long. 8 mill. (*rostr. excl.*). — *Ovatus, prothorace convexo, elytris planiusculis, fusco-niger, vix nitidulus, pube albida parve vestitus, in elytris anguste fasciolata; capite convexiusculo, densissime subtiliter punctulato, rostro tenui, arcuato, elytris parum breviore, fere laevi, basi laxe asperulo, antennis gracilimis, piceis, scapo apice subito inflato, funiculi articulis elongatis, 3 primis aequalibus, ceteris brevioribus, clava ovato-oblonga, acuminata; prothorace longitudine vix latiore, elytris angustiore, a basi arcuatim angustato, dense strigosulo, strigis arcuatis, intervallis sat elevatis, ad latera fere granulosis, margine postico medio obtusissime angulato; scutello dense albo-pubescente, medio striato, apice rotundato; elytris cuneatis, ad humeros rotundato-ampliatis, apice fortiter rotundatis, dorso punctato-striatis, striis modice impressis, sed punctis profundis sat distantibus, apice minoribus, intervallis planis, rugosis, sutura elevatis, striis apice sulcatis; subtus subtiliter aspero-punctulatus, albido-pubescentis, abdomine fortius punctulato, mesopleuris et abdominalis lateribus dense albo-pubescentibus.*

Resssemble à *Talbo-transversus* Fairm., de Kouï-Tchéou, mais plus grand, à fascies grises assez vagues et assez nombreuses, sans bande basilaire sur les élytres, et avec les fémurs un peu moins claviformes, plus fortement dentés.

Rhynchites impressus n. sp. — Long. 6 1/2 mill. (*rostr. excl.*). — Resssemble extrêmement au *R. betuleti*, d'un vert brillant ne tournant pas au bleuâtre, en diffère par les élytres à lignes ponctuées régulières, bien marquées, les intervalles à ponctuation extrêmement fine, plus serrée et plus rugueuse sur les côtés, ayant après la base une impression transversale commune très marquée, l'écusson est notablement plus large, finement rugueux avec une ligne transversale; le corselet est moins fortement arrondi sur les côtés, le disque est bien plus finement ponctué, sans impressions, avec une ligne longitudinale à peine distincte, la base est assez fortement déprimée et finement striolée en travers, ponctuée en avant assez fortement; la tête est plus finement ponctuée, surtout au sommet, assez ponctuée entre les yeux qui sont plus rapprochés, avec une impression oblongue très marquée le rostre est aussi très finement ponctué et le bord inférieur des scrobes est caréné, uni, les scrobes elles-mêmes sont profondes; les derniers articles des antennes forment une petite masse de 3 articles, mais pas nettement détachée, les 7^e et 8^e articles, courts et larges, formant presque une transition; les tarses sont d'un bleu foncé.

Cyrtotrachelus areolatus n. sp. — Long. 12 à 16 mill. (*rostr. excl.*). — *Oblongo-ovatus, valde convexus, rufus, nitidus, capite cum rostro antennisque, prothoracis vittis 3 longitudinalibus cum vitta transversa basali junctis nigris, vitta mediana antice cum collo nigro coerulea, scutello, elytrorum sutura apice dilatata, utrinque vitta mediana transversali brevi, extus late hirsuta, ramo antico cum macula humerali fere confusa et pygidio utrinque vitta lata nigra, subtus niger, pectore utrinque late rufo-maculato, episternis rufo-maculatis, abdomine lateribus, basi et apice rufo-maculato, pedibus rufis, femoribus plus minusve cum genibus, tibiarum apice tarsisque nigra; capite rugoso-punctato, inter oculos impresso, rostro basi subcylindrico, strigoso, post medium leviter concavo, subtilius strigoso, lateribus elevatis, denticulatis, apice obtuse bidentato; prothorace apice constricto et transversim impresso, dorso subtiliter et laxe, lateribus et basi densius fortiusque punctato, collo praeceps; basi sat fortiter marginata; scutello acuto, basi utrinque fortiter punctato; elytris sat brevibus, a basi attenuatis, fortiter striatis, striis luceibus, basi punctulatis, intervallis planinsculis, fortiter punctatis; pygidio subtiliter sat dense punctato, medio obsolete*

carinulato; pectore subtiliter laxe punctulato, abdomine fere lucei, lateribus breviter segmentis ultimis rugose punctatis, pedibus mediocribus.

Extrêmement voisine du *C. Davidis* Fairm., même forme, même genre de coloration avec les dessins plus tranchés, le corselet très ponctué à la base, presque lisse en avant, avec deux bandes latérales, le pygidium est plus finement ponctué, presque caréné au milieu et le rostre est légèrement concave au milieu sans ligne médiane élevée: en dessous la coloration est la même, les métapleures finement ponctuées, les pattes plus claires.

Cyrtognathus breviceps n. sp. — Long. 27 mill. — Ressemble beaucoup au *C. paradoxus*, du nord de la Chine, en diffère par la tête courte en arrière des yeux, cette partie moins rugueuse, surtout au milieu, les yeux un peu plus largement échanerés, les antennes devant aussi roussâtres vers l'extrémité, mais un peu plus courtes, les articles 3-10 épaisse à l'extrémité qui est moins acuminée, le dernier un peu plus large; le corselet est uni, lisse au milieu, ponctué en avant, avec 2 faibles impressions, et tout à fait sur les côtés, la dent médiane un peu arquée en arrière, l'antérieure plus aiguë, l'angle antérieur bien droit; l'écusson est ponctué, mais plan; les élytres, un peu plus courtes et non élargies à la base, sont plus arrondies à l'extrémité, finement coriacées, mais presque lisses en dehors vers la base; la suture est finement relevée, il y a une faible impression longitudinale sur les côtés et une ligne à peine élevée sur le disque: la poitrine est couverte d'une villosité roussâtre, le prosternum obtusément saillant en arrière, les tarses sont également roussâtres.

Tamsui (île Formose).

Aegosoma mandibulare n. sp. — Long. 34 à 38 mill. — *Elongatum, fusculo-ferrugineum, pilis squalide griseis aut cinerascentibus adpressis sat dense vestitum, elytris et sutura angustissime piceo-marginatis, prothorace utrinque maculis 2 dense rubiginoso-pilosis ornatis, 1^a subrotundata, 2^a arenata, interdum cum 1^a anguste conjuncta et transversim cum altera postica raga confusa; capite sat magno, antice densiss piloso, medio sulcato, inter antennas transversim sulcato, mandibulis validis, apice arcuatis, decussatis, fortiter bifidis et alte acute elevatis, antennis validis, corpore parum brecioribus, piceis, dense asperatis, subtus subtiliter griseo-ciliatis; prothorace brevi, elytris angustiore, antice a medio angustato, dense subtiliter asperato, medio sulcato, antice et postice utrinque impresso, basi marginata, rix basinuata,*

medio integra, angulis posticis rotundato-dilatatis; elytris elongatis, fere a basi leviter attenuatis, apice extus rotundatis, angulo suturali parum acuto, dorso subtilissime coriaceis, sutura tenuiter elevata, utrinque disco costula obtusa, basi et postice obsoleta signatis; segmento ventrali 4^o apice denudato, nitido, 5^o apice fortiter arcuatim truncato, pedibus sat gracilibus (♂); ♀ capite minore, mandibulis brevibus, apice simplicibus, haud elevatis, prothorace angustiore, pedibus paulo graciliорibus, segmento ventrali 5^o toto denudato, medio transversim valde elevato, apice levissime bisinuato.

Formose, Fou-Tchéou, Amoy.

Semblé se rapprocher de l'*ornaticolle* White par les taches couleur de rouille du corselet; mais ce dernier, qui vient de l'Inde, a 53 mill. de longueur et la description ne parle ni de la grosseur de la tête, ni des mandibules si remarquables du ♂ qui sont comprimées, fortement bidentées et croisées à l'extrémité, la dent supérieure relevée et pointue. La coloration du *marginale* Fabr. lui conviendrait mieux, mais les mêmes différences se présentent ainsi que pour le *sinicum* White décrit sur une seule ♀ et qui paraît ressembler au *scabricorne*.

Rhagium sinense n. sp. — Long. 8 à 14 mill. — *Oblongo-elongatum, fuscum, modice nitidum, depressionibus pilis ferrugineis impletis; capite lato, basi constricto, antice fere truncato, fronte planata, laxe punctata, pilosa, antennis brevibus, prothoracis basin vix superantibus, sat crassis, dense cinereo-pubescentibus; prothorace oblongo, elytris fere dimidio angustiore, medio ampliato et utrinque obtuse dentato, ante basin constricto, antice attenuato et transversim depresso, disco longitudinaliter plicis 3 laevibus ornato, ante basin transversim sat fortiter sulcato; scutello obtuso, basi foceolato; elytris oblongis, basi truncatis, ad humeros angulatis, dein vix attenuatis, apice obtusis, dorso utrinque tricostatis, costis angustis, laevis, 2^a et 3^a ante apicem conjunctis, sutura leviter elevata, interstitiis rugosis, plagulis ferrugineo-pilosis numerosis impressis; subtus cum pedibus fuscum, cinereo-villosum, pedibus sat magnis, femoribus basi rufescensibus, cinereo-maculosis.*

Cette intéressante espèce ressemble beaucoup au *R. indagator* de nos contrées montagneuses; mais il est plus petit, plus rugueux, le corselet est plus allongé, ses dents latérales sont plus obtuses, le dos présente 3 callosités oblongues, lisses, la tête est plus courte, plus large, le bord apical des segments ventraux est moins largement dénudé et les 3^e et 4^e articles des antennes sont égaux, courts, un peu plus longs seulement que le 2^e.

Leptura dissimilis n. sp. — Long. 9 à 10 mill. — *Oblonga, parum convexa, postice vix attenuata, nigra, opaca, ♀ interdum prothorace supra et elytris rubris; capite breri, transverso, basi abrupte constricto et transversim sulcato, fronte lata, planiuscula, densissime subtiliter granulata, antice fortiter declivi, transversim sulcata, clypeo truncato, nitidulo, punctato, oculis globosis, parum emarginatis, antennis sat gracilibus, corporis medium superantibus, articulo 1^o paulo clavato, arcuato, 4^o tertio et quinto paulo breviore; prothorace elytris angustiore, basi leviter ampliato, antice a medio angustato, dorso subtiliter densissime asperulo, basi transversim depressa, margine postico paulo reflexo et leviter bisinuato, angulis paulo exsertis; scutello oblongo, vir punctulato; elytris oblongis, ad humeros sat angulatis, apice truncatis, dorso dense sat fortiter punctatis, sutura elevata, utrinque nervulis 2 vix distinctis, post medium obliteratis, costa marginali basi dilatata et deplanata; subtus nitidula, sericans, marginibus centralibus dense albido-sericeis, metapleuris similiter tinctis, pedibus gracilibus, posticis longioribus.*

Fou-Tchéou.

Callidium villosulum n. sp. — Long. 7 à 11 mill. — *Oblongum, modice convexum, rufescens-arenescens, nitidum, sat dense griseo-vilosulum; antennis sat brevibus, parum gracilibus, villosulis; prothorace transverso, lateribus rotundato, dorso inaequali, punctato, lateribus utrinque et basi medio tuberculo laeri, valde obtuso signato; elytris parallelis, ad humeros valde angulatis, sat grosse parum profunde punctatis, rugulosis, basi ante humeros impressis, apice rotundatis; pedibus medioeribus, villosulis, femoribus incrassatis, tibiis posticis leviter arcuatibus.*

Ressemble assez au *C. dilatum*, mais plus petit, avec le corselet plus étroit, à ponctuation éparses, marqué de 3 reliefs, et les élytres à surface égale, densément et assez grossièrement ponctuées, mais non impressionnées; la coloration est plus roussâtre et la villosité bien marquée sur la tête et le corselet. La sculpture se rapproche davantage de celle du *Semanotus coriaceus*.

Trachystola maculipennis n. sp. — Long. 23 mill. — *Oblonga, crassa, fusca, opaca, subtiliter fuliginoso-vestita, antennis fuliginosis, articulis apice denudatis, elytris utrinque macula discoidali velutino-nigra, ferrugineo cincta; capite medio sat fortiter sulcato, antennis corpore valde longioribus, articulo 1^o crasso, rubiginoso, apice fortiter cicatricoso et rugosulo, articulo 3^o sequenti vix longiore; prothorace*

parum transverso, elytris angustiore, granuloso, granulis 2 majoribus politis, 2 posticis, 2 medianis, lateribus utrinque valde productis, dente apice obtuso armatis; scutello nudo, impresso; elytris ad humeros angulatis, subparallelis, postice tantum angustatis, apice obtusis, dorso basi et extus irregulariter perlatis; subtus cum pedibus nuda, nitidula, pilis brevibus parce instructa, femoribus apice pilis griseis dense vestitis, parce punctulata.

Cette espèce est remarquable par les 2 taches veloutées des élytres, ses antennes longues avec le scape moins tronqué, le 4^e article presque égal au 3^e, les élytres sont lisses le long de la suture et en arrière. Les antennes sont beaucoup plus longues que le corps chez le ♂, à peine plus longues chez la ♀.

Se trouve aussi dans le haut Tonkin.

Trachystola nodicollis n. sp. — Long. 25 mill. — *Oblonga, crassa, postice attenuata, fusca, fuliginosa, opaca; capite inter antennas convexo, subtiliter striato, antennis nudis, sat brevibus, articulo 1^o erasso, apice truncato-marginato et extus angulato, articulo 3^o quarto paulo breviore; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus medio dilatatis et acute spinosis, dorso postice tuberculo magno elevato, postice fisso, et antice tuberculis 2 adjectis minoribus; scutello subquadrato, rix impressiusculo; elytris ad humeros sat angulatis, gradatim attenuatis, apice obtusis, dorso fere triseriatim perlatis, serie externa magis tuberosa, interna minore, post medium abbreviata, granulis aliquot suturam versus basi sparsulis, parte lateraliter granulata; subtus cum pedibus similiter opaca, femoribus basi et apice nitidulis.*

Ressemble beaucoup à *T. granulata* Pase., de Sumatra, mais plus robuste, à antennes plus épaisses, bien distinete par le gros tubercule qui s'élève au milieu de la partie postérieure du corselet avec 2 tubercules plus petits en avant; les granulations sont plus grosses, moins serrées, et les intervalles ne présentent pas de points.

Se trouve aussi dans le haut Tonkin.

Trachystola rugiscapus n. sp. — Long. 25 mill. — Ressemble beaucoup à *T. maculipennis* Fairm., du haut Tonkin, également d'un brun noir avec un enduit très fin couleur de rouille et, sur chaque élytre, une tache d'un brun foncé velouté, entourée d'un liséré clair très étroit, plus ou moins interrompu et située en dehors; mais le corps est un peu plus convexe, les élytres sont un peu plus longues et plus atténuees en arrière dès avant le milieu, elles portent aussi, à la base, des granulations rondes, lisses, mais moins nombreuses surtout sur

les côtés où elles sont très écartées tandis qu'elles se prolongent le long de la suture, mais très petites, très clairsemées et devenant veloutées, formant même, par leur agglomération, une sorte de petite tache avant l'extrémité, l'écusson est couvert de l'enduit rubigineux et n'est pas concave, le corselet est bien plus court, un peu moins dilaté sur les côtés, sillonné transversalement à la base et en avant, le dessus est légèrement rugueux, sans les granulations et les tubérosités du *maculipennis*; le front est bien plus large, les antennes sont bien plus écartées à la base et le scape est rugueux; le dessous et les pattes sont de la même couleur que le dessus, parsemés également de petits poils blanchâtres très fins, couchés, les fémurs n'ont pas de tache blanche à l'extrémité.

Leprodera bioculata n. sp. — Long. 24 mill. — *Oblonga, postice parum attenuata, indumento cinereo dense in capite prothoraceque paulo lutoso vestita, capite et prothorace utrinque infuscatis, elytris utrinque macula magna fusco-picea, fere velutina, laterali, fere obtuse triangulare, ad marginem dilatata, intus obtuse rotundata et suturam haud attingente, et medio baseos annulo orato fusco, piceo, oculum fulvidum cum pupilla picea includente, elytrorum apice piceo breviter signato; capite medio tenuiter sulcatulo, antennis sat validis, fuscis, articulis primis rugosis, 1^o lutoso tincto; prothorace utrinque acute spinoso, dorso obsolete antice transversim impresso, postice medio similiter, sed ad latera profundius; elytris ad humeros valde angulatis et paulo granosis, basi sub oculis paulo elevatis et circa scutellum paulo piceo-scriptis, sutura basi et apice paulo elevata; subtus cum pedibus picea, lutoso-tincta, rugis denudatis, tibiis anticus intus dente lato triangulari armatis.*

Resssemble à *L. epicedioides* Pasc., ayant comme elle une grande tache d'un brun foncé velouté de chaque côté des élytres, mais celles-ci sont plus courtes et ont à leur base une tache cordiforme assez curieuse, elles sont aussi bien moins rétrécies en arrière, la tête est plus longue, le corselet plus court, non rugueux, avec les impressions transversales obsolètes, la dent des tibias antérieurs est plus large.

Archidice Carolina n. sp. — Long. 25 mill. — *Oblonga, convexa, fuliginosa, maculis minutis rubiginosis sat dense variegata, capitis vertice et prothoracis rictis 2 dorsalibus dense rubiginoso-pubescentibus, elytris utrinque ante medium maculis 3 sat magnis suboratis, intus macula minore comitatis, et ante apicem maculis 3 albis, punctis albis intermixtis; capite inter antennas profunde sulcato, antice sulco tenui-*

apice latiore signato, clypeo truncato, antice cum labro longe rubiginoso-piloso, facie et genis maculis rubiginosis minutis sparsutis, antennis articulo 1^o crasso, cylindrico, dense rubiginoso-pubescente, apice eras- siore et denudato, articulo 3^o fere toto rubiginoso, veteris parte basali dimidia tantum; prothorace elytris dimidio angustiore, utrinque lateribus spina valida acuta armato, dorso ruguloso; scutello rubigi- noso; elytris ad humeros angulatis, postice vix attenuatis, ante apicem angustatis, apice leviter truncatis, basi granulis nigris nitidis ornatis, maculis albis impressis; subtus cum pedibus fuliginosa, punctis et punc- tulis albidis numerosis sparsata.

Ressemble assez à l'A. *sexnotata* Th., de Pédong, mais les taches des élytres sont bien plus nombreuses, la tête et le corselet sont largement tachés, ce dernier n'a pas de plis transversaux, les élytres sont bien plus atténues en arrière et les granulations de la base sont plus grosses et plus rares.

Pyresthes rugicollis n. sp. — Long. 42 mill. — *Valde elongatus, niger, sat nitidus, elytris rubris, prothorace medio rubeo, antice et basi transversim rubro; capite rugoso, inter oculos tuberoso, antennis vali- dis, elytrorum medium valde superantibus, articulis 5-10 apice angu- latis, supra sulcatis; prothorace latitudine longiore, valde ac dense rugato, postice utrinque paulo oblique plicatulo; scutello orato, rugoso; elytris elongatis, basi truncatis et prothorace dimidio latioribus, postice levissime ampliatis, apice rotundatis, dorso dense punctatis, basi fortius, leviter rugosulis, sutura ad scutellum depressa, dein elevata, pectore dense rugosulo-punctulato, ab domine fere laeri, pedibus bre- ribus, sat gracilibus.*

Bien distinct de ses congénères par son corselet très rugueux, non atténué en avant, presque complètement noir, et ses élytres presque ruguleusement ponctuées.

Aphrodisium Latouchei Fairm. — Long. 32 à 47 mill. — Ce bel insecte, trouvé au Fokien il y a plusieurs années, se rencontre aussi dans le haut Tonkin. Les individus qui en proviennent sont plus bleuâtres, notamment sur la tête et sur la partie antérieure et posté- rieure du corselet. Les élytres sont plus veloutées, ayant une teinte brune formant une bande longitudinale longeant la bande suturale roussâtre qui n'atteint ni la base ni l'extrémité; la poitrine est bleue ou verdâtre, souvent dénudée, l'abdomen, qui est aussi variable du bleu au vert roussâtre, est couvert d'une épaisse pubescence rousse.

Praonetha sinensis n. sp. — Long. 8 mill. — *Oblonga, sat crassa,*

lateribus paulo compressa, fusa, subopaca, levissime metallescens, elytris ruge ferrugineo-maculosis; capite brevi, inter antennas transversim sulcato et antice impresso, tuberculis antennariis angustatobarbaratis, antennis crassiusculis, subtus laxe ciliatis, articulis basi brevissime pallidis, articulo 1^o crasso, prothoracis medium attingente, 4^o tertio paulo longiore; prothorace transversim subquadrato, elytris angustiore, lateribus fere rectis et parallelis, antice tantum leviter arcuatis; dorso sat subtiliter dense rugosulo-punctato et impressusculo, basi paulo marginata; scutello transverso, paulo convexo, truncato; elytris ad humeros sat rotundatis, a medio postice attenuatis, apice separatim rotundatis, dorso sat grosse parum dense punctatis, paulo rugosulis, ante medium obsolete transversim impressis, basi utrinque crista compressa, medio interrupta, parte basali magis elevata siqualis, extus costula parum convexa, fere granulosa, sutura sat elevata, dilutiore, fusco laxe punctata, basi depressa; pedibus brevibus, sat validis, ferrugineo-annulatis.

Resssemble à quelques espèces de l'extrême-Orient dont les élytres sont aussi ornées de crêtes longitudinales, mais distincte par sa taille plus faible, ses élytres arrondies à l'extrémité et le corselet uni.

Agapanthia melanolopha n. sp. — Long. 42 mill. — Sat elongata, sat convexa, cyaneo-violacea, parum nitida, subtiliter dense fuscopilosula; capite sat fortiter punctato, antice longius piloso, medio fortiter sulcato, antennis sat gracilibus, articulo 1^o nigro, elongato, villosulo, ceteris articulis griseis, apice nigris, 3^o apice dense nigro-villoso, fere clarato, ceteris apice parcis villosulis; prothorace transverso, subquadrato, antice rix attenuato, dorso fortiter punctato, paulo rugosulo; scutello fere truncato, punctato, fere fuso; elytris parallelis, ad humeros rotundato-angulatis, apice rotundatis, dense punctalo-rugosis, subtus cum pedibus concolor, nitidior, subtiliter coriacea, tibiis tarsisque infuscatis, illis fulrido-villosulis, tarsis anterioribus articulis 3 primis basi griseis.

Resssemble beaucoup à la *pilicornis*, de Sibérie, en diffère par le 3^e article des antennes terminé par une houppette de poils noirs, longs et serrés, les élytres bien plus rugueuses, la tête fortement creusée entre les yeux et enfin les tarses antérieurs annelés de gris.

